CLS 45/14 ExS Pro (swim)



AQUAKULTURFUTTER – KREISLAUFFUTTER

Afrikanischer Wels *Clarias gariepinus*

Illustration: KI-generiert



BESCHREIBUNG

- ✓ **Hochwertiges Fischmehl:** marines Protein der Extraklasse – **ideal für Wachstum**.
- ✓ **Shrimpsmehl:** erhöht die **Futterakzeptanz**.
- ✓ **Hoher Anteil tierischer Proteine:** hochverdaulich – **ohne Proteinkonzentrate**.
- ✓ **Schwimmend und wasserstabil:** **Futteraufnahme sichtbar** – weniger Verlust, klares Wasser.
- ✓ **Hefeprodukt:** **Qualitätsmerkmal** mit MOS und Beta-Glucan für die Darmgesundheit.
- ✓ **Lachsöl:** reich an **Omega-3-Fettsäuren** für Vitalität.
- ✓ **Sehr gute Futterverwertung:** FCR ab **0,90** – wirtschaftlich und umweltschonend.
- ✓ **Wenig Rohfaser:** nur 1,16 % – **geringere Ausscheidungen**, sauberes Wasser.
- ✓ **Pro-Linie:** ausgewogene **Nährstoffdichte** für leistungsstarke Bestände.

ZUSAMMENSETZUNG

in absteigender Reihenfolge nach Gewichtsanteil

Geflügelfleischmehl, Fischmehl, Sorghumhirse, Weizen, Blutmehl, Rapssaat, Federmehl hydrolysiert, Lachsöl, Futterkalk, Shrimpsmehl, Hefeprodukt (reich an MOS und Beta-Glucan).

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

NÄHRSTOFF	GEHALT
Rohprotein	**44,77 %**
Rohfett	**14,08 %**
Rohfaser	1,16 %
Rohasche	6,40 %
Phosphor	0,79 %
Calcium	1,77 %
Natrium	0,19 %

ZUSATZSTOFFE PRO KG FUTTER

ZUSATZSTOFF	MENGE
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCH	
Vitamin A (3a672a)	15.000 I.E.
Vitamin D3 (3a671)	2.000 I.E.
Vitamin E (3a700)	200 mg
Vitamin C (3a312)	300 mg
Methionin (3c301)	3.000 mg
Cholinchlorid (3a890)	1.200 mg
Eisen (Eisen-(II)-Sulfat) 3b103	125 mg
Iod (Calciumjodat) 3b202	2 mg
Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat) 3b405	6 mg
Zink (Zinkoxid) 3b603	80 mg
Mangan (Mangan-(II)-Oxid) 3b502	20 mg
TECHNOLOGISCH	
Butylhydroxytoluol (BHT) (E 321)	120,63 mg
Montmorillonit-Illit (1g557)	5.000 mg

ALTERNATIVEN IM SORTIMENT

ohne Soja → **CLS 43/14 ExS Classic (swim)** S. 38
unter 200 g → **CLS 47/14 ExS (swim)** S. 36
Alle Futter im Vergleich: Auswahlhilfe S. 6–8

GMP+ Feed Safety Assurance · RAS geeignet · MADE IN GERMANY

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG · kg Futter pro 100 kg Fisch und Tag nach Wassertemperatur (°C)

Fischgewicht (g)	Körnung (mm)	möglicher FCR*	24	26	28	30
200–500	4,5	**0,90**	2,1	2,3	**2,4**	2,2
500–1.500	6	**1,00**	1,2	1,3	**1,4**	1,3

* Unter optimalen Umweltbedingungen. Basierend auf Kundenergebnissen und -erfahrungen.
Verbindlich sind die Angaben auf dem Etikett des Sacks bzw. Big Bags. Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Orientierung; Änderungen vorbehalten.