ZFS 54/13,5 EX

● auf Anfrage · ab 3 t pro Körnung

AQUAKULTURFUTTER – KREISLAUFFUTTER



Zander *Sander lucioperca*

Illustration: KI-generiert



BESCHREIBUNG

- ✓ **Hochwertiges Fischmehl:** marines Protein der Extraklasse – **ideal für Wachstum**.
- ✓ **Shrimpsmehl:** erhöht die **Futterakzeptanz**.
- ✓ **Hoher Anteil tierischer Proteine:** hochverdaulich – **ohne Proteinkonzentrate**.
- ✓ **Kohlenhydratreduziert:** niedriger Stärkegehalt – **stabile Blutzuckerwerte**, gute Verdaulichkeit.
- ✓ **Hefeprodukt:** **Qualitätsmerkmal** mit MOS und Beta-Glucan für die Darmgesundheit.
- ✓ **Lachsöl:** reich an **Omega-3-Fettsäuren** für Vitalität.
- ✓ **Weißer Federmohn:** natürlicher **Pflanzenextrakt**.
- ✓ **Sehr gute Futterverwertung:** FCR ab **1,00** – wirtschaftlich und umweltschonend.
- ✓ **Wenig Rohfaser:** nur 0,88 % – **geringere Ausscheidungen**, sauberes Wasser.

ZUSAMMENSETZUNG

in absteigender Reihenfolge nach Gewichtsanteil

Fischmehl, Weizen, Lachsöl, Shrimpsmehl, Ackerbohnen-Stärke, Federmehl hydrolysiert, Blutmehl, Soja-Lecithin, Monocalciumphosphat, Weißer Federmohn, Hefeprodukt (reich an MOS und Beta-Glucan).

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

NÄHRSTOFF	GEHALT
Rohprotein	**53,18 %**
Rohfett	**13,59 %**
Rohfaser	0,88 %
Rohasche	11,01 %
Phosphor	1,37 %
Calcium	2,24 %
Natrium	0,47 %

ZUSATZSTOFFE PRO KG FUTTER

ZUSATZSTOFF	MENGE
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCH	
Vitamin A (3a672a)	15.000 I.E.
Vitamin D3 (3a671)	2.000 I.E.
Vitamin E (3a700)	350 mg
Vitamin C (3a312)	450 mg
Methionin (3c301)	5.000 mg
Lysin (3c322)	4.000 mg
Cholinchlorid (3a890)	4.320 mg
Eisen (Eisen-(II)-Sulfat) 3b103	125 mg
Iod (Calciumjodat) 3b202	2 mg
Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat) 3b405	6,05 mg
Zink (Zinkoxid) 3b603	80,08 mg
Mangan (Mangan-(II)-Oxid) 3b502	20,05 mg
TECHNOLOGISCH	
Butylhydroxytoluol (BHT) (E 321)	83,63 mg
Montmorillonit-Illit (1g557)	2.500 mg

ALTERNATIVEN IM SORTIMENT

schwimmend → **ZFS 52/13,5 ExS (swim)** ● S. 47

Alle Futter im Vergleich: Auswahlhilfe S. 6–8

GMP+ Feed Safety Assurance · RAS geeignet · MADE IN GERMANY

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG · kg Futter pro 100 kg Fisch und Tag nach Wassertemperatur (°C)

Fischgewicht (g)	Körnung (mm)	möglicher FCR*	18	20	22	24	26
100–300	4,5	**1,00**	0,7	0,9	1,0	**1,2**	**1,2**
300–1.000	6	**1,10**	0,5	0,6	0,7	**0,8**	**0,8**

* Unter optimalen Umweltbedingungen. Basierend auf Kundenergebnissen und -erfahrungen.
Verbindlich sind die Angaben auf dem Etikett des Sacks bzw. Big Bags. Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Orientierung; Änderungen vorbehalten.